

لیست روزهای تزریق واکسن MMR در مراکز سطح شهر بیرجند

روز تزریق MMR	پایگاه سلامت	مرکز خدمات جامع سلامت	روز تزریق MMR	پایگاه سلامت	مرکز خدمات جامع سلامت
یکشنبه - سه شنبه	ضمیمه توحید	توحید	شنبه - سه شنبه	ضمیمه قدس	قدس
سه شنبه	پ س جماران		سه شنبه	پ س عدل	
چهارشنبه	ضمیمه آوینی	آوینی	دوشنبه - چهارشنبه	ضمیمه جمهوری	جمهوری
شنبه	پ س نیلوفر		دوشنبه	پ س معصومیه	
یکشنبه	پ س زلفر		یکشنبه	پ س شیرین	
یکشنبه - چهارشنبه	ضمیمه کارگران	کارگران	دوشنبه	ضمیمه جوادیه	جوادیه
دوشنبه	پ س صدیقه طاهره		چهارشنبه	پ س موسی بن جعفر	
سه شنبه	پ س شعبانیه		یکشنبه	پ س میلاد	
دوشنبه - چهارشنبه	ضمیمه مهرشهر	مهرشهر	دوشنبه	پ س ۱۷ شهریور	غدير
دوشنبه	پ س حافظ مهرشهر		دوشنبه - چهارشنبه	ضمیمه غدیر	
			دوشنبه	پ س سراب	
			سه شنبه	پ س شاهد	

جدول واکسیناسیون کودکان کشور ایران



سن کودک	نوع واکسن
بدو تولد	فلج اطفال - سل - هپاتیت ب
دو ماهگی	فلج اطفال - هپاتیت ب - دیفتری - کزاز - سیاه سرفه - هموفیلوس آنفولانزا تیپ ب
چهار ماهگی	فلج اطفال خوراکی و تزریقی - هپاتیت ب - دیفتری - کزاز - سیاه سرفه - هموفیلوس آنفولانزا تیپ ب
شش ماهگی	فلج اطفال - هپاتیت ب - دیفتری - کزاز - سیاه سرفه - هموفیلوس آنفولانزا تیپ ب
۱۲ ماهگی	سرخک - سرخجه - اوریون
۱۸ ماهگی	فلج اطفال - دیفتری - کزاز - سیاه سرفه - سرخک - سرخجه - اوریون
۶ سالگی	فلج اطفال - دیفتری - کزاز - سیاه سرفه

جدول شماره ۱: طبقه بندی AEFIs	
موارد ناشی از جزء لاینفک واکسن هستند حتی در صورتیکه واکسن به‌طور صحیح داده شود.	واکنش به واکسن (Vaccine Reaction)
موارد ناشی از اشکال در آماده کردن، حمل و نقل، نحوه تزریق و هستند	اشتباه در برنامه (Program error)
مواردیکه بعد از ایمن سازی ظاهر شده ولی هیچ ارتباطی به واکسن و واکسیناسیون ندارند.	واکنش های همزمان (Coincidental)
موارد ناشی از دلشوره یا درد ناشی از تزریق هستند	واکنش تزریقات (Injection reaction)
موارد ناشی از علت های ناشناخته هستند	ناشناخته (Unknown)

جدول شماره ۲: عوارض خفیف و شایع واکسن و درمان آنها

علائم عمومی	تب بالای ۳۸ درجه ساتیگراد	عوارض موضعی (درد، ورم، قرمزی)	واکسن
—	—	۹۵-۹۰٪	ب. ث. ژ
—	۱۰-۲٪	۱۵-۵٪	هموفیلوس آنفلوانزا
—	۶-۱٪	بزرگسالان حدود ۱۵٪، خردسالان حدود ۵٪	هپاتیت ب
۵٪ (بثورات جلدی)	۱۵-۵٪	حدود ۱۰٪	Measles / MMR/MR
کمتر از یک درصد (۱)	کمتر از یک درصد	—	OPV
حدود ۲۵ درصد	حدود ده درصد	حدود ده درصد ^(۲)	T/DT/ Td
تا ۵۵ درصد	تا ۵۰ درصد	تا ۵۰ درصد	سیاه سرفه (ثلاث)
مایعات اضافی، مسکن و تب‌بر	مایعات اضافی، لباسهای مناسب، پاشویه، مسکن و تب‌بر	رجوع به اقدامات پس از واکسیناسیون در صفحه ۱۹	درمان